

Itinéraire technique

La préparation du sol

L'objectif est d'avoir une levée rapide et régulière pour obtenir un couvert dense limitant le salissement par des adventices.

Un labour permettra d'aérer le sol sur une profondeur de 25 cm, pour assurer une bonne implantation racinaire des plantes. Le développement racinaire permettra aux plantes de mieux résister aux aléas climatiques des mois d'été.

Les graines de fleurs sont de petite taille et nécessitent un lit de semis préparé finement à l'aide d'un outil à dent, type vibroculteur, cultivateur.

Le semis

La densité de semis est relativement faible, pour obtenir un résultat optimal, il faut privilégier un semis précoce en avril pour assurer une levée rapide et homogène afin de limiter la concurrence des adventices naturellement présentes dans le sol.

Le semis à la volée est la technique la plus fréquemment utilisée. L'utilisation d'un semoir garanti un respect des densités préconisées si vous avez une grande surface à semer. Dans tous les cas privilégier un semis de surface avant d'effectuer un passage de rouleau.

Le désherbage

Une des clefs de réussite de votre prairie fleurie consiste à limiter le développement des adventices sur votre parcelle.

Il y a différentes techniques de désherbage possible :

Désherbage mécanique : la technique du faux-semis.

Après un premier travail du sol, laisser les adventices se développer et passer un outil rotatif de façon superficielle afin de les éliminer (reproduire l'opération 2 fois si nécessaire).

Désherbage chimique

Il est possible de faire un désherbage en pré semis avec du glyphosate (matière active) pour éliminer les plantules d'adventices en place. Un désherbage sélectif n'est malheureusement pas possible.

Les premières semaines, il est judicieux de vérifier le développement des adventices. Si elles sont présentes à trop forte densité il faudra les éliminer manuellement. Une fois la prairie fleurie bien installée les adventices seront maîtrisées par la végétation en place.

Entretien

L'entretien se limitera à deux tontes (coupes) dans l'année, la première s'effectuera mi-juin si nécessaire, la seconde en automne (mi-octobre). La fauche se fera avec une tondeuse en position haute, mais de préférence avec une faucheuse mécanique ou manuellement avec une faux. La hauteur de coupe ne devra pas être inférieure à 10 cm. La végétation coupée devra être enlevée. La première coupe au mois de juin ne se justifie que si la végétation vous semble trop dense ou trop infestée par des adventices.

Une prairie fleurie bien entretenue aura une durée de vie minimum de 4 ans voir plus.



ZI OUEST – RUE GEORGE BESSE 67150 ERSTEIN
Tel : 03 88 22 10 74 Fax : 03 88 75 65 76
nungesser.semences@wanadoo.fr
www.nungesser.net

MARCHE A SUIVRE POUR LES NOUVEAUX SEMIS

1. **Détruire complètement l'ancien gazon** (déplaquer, fraiser, couvrir d'un plastique noir, herbicide totale...etc)
2. **Laisser le sol se raffermir.** Une parcelle fraîchement préparée ou après un apport de terre végétale et une plante parfaite doit se raffermir durant 4 à 6 semaine au moins. Ceci est un des points essentiels pour la réussite d'un nouveau semis.
3. Juste avant le semis travailler le sol très superficiellement (max 2 – 3 cm) afin de détruire les mauvaises herbes germées. Le lit de semis ne doit pas être trop fin pour éviter la formation d'une croûte après la première forte averse.
4. **Période de semis** : le mieux est dès le départ de la végétation avril à mi-juin. Les semis de juillet peuvent parfois réussir, mais uniquement avec un arrosage suffisant.
5. **La densité des semis** des mélanges prairies Sédamix est toujours de 10g/m. Respecter la densité recommandée (Double densité = demi-succès). Le semis se fait à la main en deux passages : une fois en long et une fois en large. Pour les grandes surfaces, choisir un semoir avec un réglage précis.
6. **Enfouir très légèrement les semences** à la main (râteau). Les graines recouvertes avec plus de 1 cm de terre ne vont pas germer (la plupart germent à la lumière).
7. **Rouler le semis** ou l'appuyer avec une pelle, afin de favoriser le contact des graines avec le sol.
8. **Avoir de la patience** et informer les voisins. Une prairie fleurie nouvellement mise en place a souvent un vilain aspect. Le profane ne voit que les mauvaises herbes et les trous. Mais c'est l'aspect normal, les fleurs sauvages ne fleurissent qu'après un hivernage.
9. Le désherbage mécanique fait plus de mal que de bien, car il détruit les fleurs en germination.
10. Effectuer la **première coupe de nettoyage** lorsque la lumière n'atteint plus le sol ou que les premières mauvaises herbes commencent à fleurir (en général 8 - 12 semaines après le semis). Hauteur de coupe 8 – 10 cm. Les grandes quantités de résidus de tonte sont à éliminer soigneusement. Plusieurs coupes de nettoyage sont souvent nécessaires la première année.
11. **Attention aux limaces.** Elles apprécient par-dessus tout les pousses ou germes de fleurs sauvages. Les dégâts les plus importants sont observés dans les semis en bandes. Une lutte préventive contre les limaces n'est pas nécessaire car même avec une pression élevée, elles détruisent rarement toute la prairie.
12. **Ressemis.** Un nouveau semis d'une prairie riche en espèces se fait toujours sur un sol nu. **Les sursemis dans une prairie ou un gazon existant sont inutiles.**



SOINS APPROPRIES AUX PRAIRIES FLEURIES

Meilleure période pour la première coupe

Il est temps de faire la première coupe lorsqu'il y a quelque chose à récolter. C'est à dire début juin sur un sol riche et fin juin sur un sol plutôt pauvre. Dans les cas extrêmes, attendre le mois de juillet. Encore mieux serait de faucher la moitié de la prairie et la deuxième partie à une semaine d'intervalle, ou avant la prochaine période de beau temps. On procède à la deuxième (troisième) coupe principale lorsqu'il y a de nouveau quelque chose à récolter.

Avant l'hiver, la prairie doit avoir pousser un peu.

Fanage

Choisir une période de beau temps assez longue pour faire les foin. Le fourrage doit sécher sur la parcelle pour que les graines puissent mûrir et tomber au sol. Engranger le foin après trois jours lorsqu'il est bien sec. En ramassant l'herbe de suite après la fauche, la diminution du nombre d'espèces s'avère importante.

Faucher assez haut entre 5 et 10 cm et éviter les dégâts au terrain (ne pas aplanir le sol en rabotant les bosses). Les petites parcelles sont fauchées à la faux et les plus grandes à la moto faucheuse. L'emploi d'une débroussailluse est assez délicat. Le mulching est à éviter.

Fumure

Une prairie fleurie ne nécessite aucune fumure : pas d'engrais minéraux, pas de fumier, ni de compost ne sont à apporter.

Arrosage

Ne jamais arroser la prairie, même pendant une sécheresse prolongée. Cette dernière crée de l'espace pour de nouvelles plantes.

Théorie et pratique

La seule erreur qui ne pardonne pas dans le soin aux prairies : la répétition. on peut faucher une prairie une fois trop tôt ou une fois trop tard, trop haut ou trop bas. On peut ramasser une fois de l'herbe plutôt que du foin . mais il faut éviter de répéter la même erreur plusieurs fois ou chaque année.

